

■ Phase 5 : Propulsion d'oxygène®

Seconde phase du système Oxyendodermie®

• Appliquer mbe l'Imagine Lipolytic Sérum sur les adiposités à traiter, puis procéder à la phase de Propulsion d'Oxygène® pour favoriser la pénétration en profondeur des principes actifs.

L'oxygène pur pressurisé pousse en profondeur les actifs du sérum et le tissu cutané, bien vascularisé, est en mesure de mieux les absorber.



■ Phase 6 : enveloppement gel inhalation d'oxygène

• Pour obtenir un effet drainant, traiter les tissus gonflés et la rétention d'eau, appliquer une couche de mbe l'Imagine Superdraining Gel, puis envelopper la zone de film alimentaire. Laisser poser 15 minutes.

• Durant le temps de pose de l'enveloppement, appliquer au client le casque oxygène. La phase d'inhalation lui donnera une immédiate sensation de bien-être, tout en lui procurant énergie et vitalité.

• Une fois le temps de pose écoulé, éliminer la pellicule et masser jusqu'à complète absorption des résidus cosmétiques.



■ Phase 7 : crème finale

• Finaliser le traitement par l'application de mbe l'Imagine Lipolytic Emulsion pour un effet lipolytique ou par l'Imagine Firm and Flex Emulsion pour une action tonifiante.



CONSEIL

Fréquence idéale : 2 fois par semaine

Cycle idéal : 12 séances

Nombre de cycles/an : 2

Cycle complet : 6 séances

Produits relais à domicile

• Imagine Lipolytic Emulsion

• Imagine Firm and Flex Emulsion.